On a représenté un terrain de rugby vu de dessus.

Un joueur J placé le long de la touche (OT) doit transformer un essai en envoyant le ballon entre les poteaux A et B. On cherche à quelle distance OJ de la ligne de but il doit se placer pour que l'angle de tir soit maximal.

On donne $OA = 37,5 \text{ m}$, $AB = 5,6 \text{ m}$ et on note $OJ = x$, en mètre, avec $0 \leq x \leq 100$. On note $\alpha = \widehat{OJA}$ et $\beta = \widehat{OJB}$, et $\theta = \widehat{BJA}$ l'angle de tir.

1. Exprimer $\tan(\alpha)$ et $\tan(\beta)$.
2. Démontrer que $\tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$.
- 3.a. Etudier le sens de variation sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ de la fonction $\tan : \theta \rightarrow \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$.
- b. En déduire que $\tan \theta$ est maximal quand θ est maximal.
4. Soit $f(x) = \frac{5,6 x}{x^2 + 1600,17}$ sur $[0; 100]$.
 - a. Déterminer en quelle valeur x_0 , f atteint son maximum.
 - b. Préciser la position du joueur pour un angle de tir maximal et donner cet angle à $0,1^\circ$ près.

Sera t'il si facile de transformer l'essai ?

CORRECTION

$$1. \quad \tan(\alpha) = \frac{OA}{OJ} = \frac{37,3}{x} \quad \text{et} \quad \tan(\beta) = \frac{OB}{OJ} = \frac{37,3 + 5,6}{x} = \frac{42,9}{x}.$$

$$2. \quad \tan(\beta - \alpha) = \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\cos(\beta - \alpha)} = \frac{\sin \beta \cos \alpha - \sin \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta}.$$

$$\tan(\beta - \alpha) = \frac{\cos \alpha \cos \beta \left(\frac{\sin \beta}{\cos \beta} - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right)}{\cos \alpha \cos \beta \left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \times \frac{\sin \beta}{\cos \beta} + 1 \right)} = \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

$$3.a. \quad \text{Etudier le sens de variation sur } \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \text{ de la fonction } \tan : \theta \rightarrow \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}.$$

La fonction $\tan$ est le quotient de deux fonctions dérivables sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ donc est dérivable sur son domaine de définition.

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \text{ soit } \begin{cases} u(x) = \sin x & u'(x) = \cos x \\ v(x) = \cos x & v'(x) = -\sin x \end{cases} \text{ donc } \tan'(x) = \frac{\cos^2 x - (-\sin x) \sin x}{(\cos x)^2} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

La fonction $\tan$ est donc strictement croissante sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$
$\tan'(x)$	+	
$\tan$	0	$+\infty$

$$b. \quad \text{La fonction } \tan \text{ est strictement croissante sur } \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \text{ donc } \tan \theta \text{ est maximal quand } \theta \text{ est maximal.}$$

4. Soit $f(x) = \frac{5,6x}{x^2 + 1600,17}$ sur $[0 ; 100]$.

a. $f'(x) = \frac{x^2 + 1600,17 - x \times 2x}{(x^2 + 1600,17)^2} = \frac{1600,17 - x^2}{(x^2 + 1600,17)^2} = \frac{(\sqrt{1600,17} - x)(\sqrt{1600,17} + x)}{(x^2 + 1600,17)^2}$ $x \in [0 ; 100]$ donc $f'(x)$ a le même signe que $\sqrt{1600,17} - x$.

x	0	$\sqrt{1600,17}$	100
$f'(x)$	+	0	-
f	0		

f atteint son maximum pour $x_0 = \sqrt{1600,17}$

b. $\tan \theta = \tan(\beta - \alpha) = \frac{\tan \beta - \tan \alpha}{1 + \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{42,9}{x} - \frac{37,3}{x}}{1 + \frac{37,3}{x} \times \frac{42,9}{x}}$

$\tan \theta = \frac{5,6x}{x^2 + 1600,17}$ donc $\tan \theta$ est maximal pour $x = \sqrt{1600,17}$

$\tan \theta$ est maximal quand θ est maximal donc θ est maximal pour $x = \sqrt{1600,17}$.

$\tan \theta = \frac{5,6 \times \sqrt{1600,17}}{2 \times 1600,17} = \frac{2,8 \times \sqrt{1600,17}}{1600,17}$ donc $\theta \approx 0,07^\circ$

La transformation sera particulièrement délicate.