1. Etude dans $[0; \pi]$ de l'équation $\sin x = \frac{x}{2}$ (1)

a. T et Δ sont les courbes représentatives respectives des fonctions g et h définies sur $[0; \pi]$ par $g(x) = \sin x$ et $h(x) = \frac{x}{2}$

Dessiner soigneusement T et Δ sur $[0; \pi]$.

En examinant les 2 courbes, expliquer brièvement pourquoi l'équation (1) possède deux solutions dont l'une est le réel 0

b. f est la fonction définie sur $[0; \pi]$ par $f(x) = \frac{x}{2} - \sin x$.

Calculer $f'(x)$ et donner son signe

Dresser le tableau de variation de f

c. En énonçant le théorème utilisé, démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet un intervalle $[\frac{\pi}{2}; \pi]$ une unique solution x_0 .

Donner l'encadrement d'amplitude 10^{-2} de x_0 .

2. Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 1cm). Les angles seront exprimés en radians et les aires en cm^2 .

Soit $\theta \in]0; \frac{\pi}{2}[$, A et B les points de coordonnées respectives $(\cos \theta; \sin \theta)$ et $(\cos \theta; -\sin \theta)$, D le disque de centre O et de rayon 1,

et (E) l'ensemble des points de D d'abscisse supérieure ou égale à $\cos \theta$.

a. Calculer, en fonction de θ , l'aire T du triangle BOA.

b. On rappelle que l'aire d'un secteur angulaire intercepté par un angle de mesure α (en radians) dans un disque de rayon R est égale à $\alpha \frac{R^2}{2}$.

Calculer, en fonction de θ , l'aire S de (E) (on pourra d'abord calculer S + T)

c. On pose $\alpha = 2\theta$. Pour quelle valeur de α a-t-on $S = T$?

CORRECTION

1. Etude dans $[0; \pi]$ de l'équation $\sin x = \frac{x}{2}$ (1)

a. Δ est un segment de droite qui passe par les points de coordonnées $(0; 0)$ et $(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.

x	0	0,25	0,5	0,75	1	$\frac{\pi}{2}$
g(x)	0	0,25	0,48	0,68	0,84	1

x	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	π
g(x)	0,98	0,91	0,78	0,60	0,38	0,14	0

d'où le tracé de la fonction g.

Les deux courbes admettent deux points d'intersection : l'un est l'origine du repère l'autre a une abscisse x_0 voisine de 1,9 donc l'équation (1) possède deux solutions dont l'une est le réel 0.

b. $f'(x) = \frac{1}{2} - \cos x$.

$\cos x = \frac{1}{2}$ et $x \in [0; \pi] \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3}$.

La fonction cosinus est décroissante sur $[0; \pi]$ donc $\frac{1}{2} - \cos x < 0$ et $x \in [0; \pi] \Leftrightarrow x \in [0; \frac{\pi}{3}[$.

x	0	$\frac{\pi}{3}$	π
$f'(x)$	-	0	+
f	0	M	$\frac{\pi}{2}$

avec $M = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

c. La fonction f est définie continue strictement décroissante sur $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$;

L'image par f de $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ est $\left[f(\pi); f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]$

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - 1$ donc $f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$ et $f(\pi) > 0$ donc $0 \in \left[f(\pi); f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right]$ donc l'équation $f(x) = 0$ admet l'intervalle $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ une unique solution x_0 .

$f(1,89) \approx -0,0045$ et $f(1,90) \approx 0,0037$ donc $1,89 < x_0 < 1,90$

2. a. L'aire T du triangle BOA est égale à $\frac{1}{2} \times OC \times AB$

$\theta \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ donc $\cos \theta > 0$ et $\sin \theta > 0$

$OC = \cos \theta$ et $AB = 2 AC = 2 \sin \theta$ donc $T = \cos \theta \sin \theta$

$$T = \frac{1}{2} \sin (2 \theta)$$

b. Le cercle a pour rayon 1, $S + T$ est l'aire du secteur

angulaire OAB donc son aire est $2 \theta \times \frac{1}{2} = \theta$.

$S = (S + T) - T$ donc $S = \theta - \cos \theta \sin \theta$

$$S = \theta - \frac{1}{2} \sin (2 \theta)$$

c. $S = \theta - \frac{1}{2} \sin (2 \theta) = \frac{1}{2} \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha$ et $T = \frac{1}{2} \sin (2 \theta) = \frac{1}{2} \sin \alpha$

$$S = T \Leftrightarrow \frac{1}{2} \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha = \frac{1}{2} \sin \alpha \Leftrightarrow \frac{1}{2} \alpha - \sin \alpha = 0 \Leftrightarrow f(\alpha) = 0$$

$\theta \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ et $\alpha = 2 \theta$ donc $\alpha \in]0; \pi [$

$f(x) = 0$ admet sur $]0; \pi [$ deux solutions : 0 et x_0 , $\alpha \in]0; \pi [$ donc $\alpha = x_0$ donc $\theta = \frac{1}{2} x_0$.