




Le chat de Temminck

Le chat de Temminck ou chat doré d'Asie, dont on sait peu de chose de ses comportements à l'état sauvage, est un félin de taille moyenne au pelage brun doré même si certains individus sont noirs ou tachetés ou encore rayés à certains endroits du corps. Sa tête est, quant à elle, rayée de blanc et de noir. Son ventre possède une grande tache blanche.



NOM : Chat de Temminck ou chat doré d'Asie (*Pardofelis temminckii*)

CLASSE : Mammifères

ORDRE : Carnivores

FAMILLE : Félidés

POIDS : 15 kg

TAILLE : longueur de 70 cm à 1 m, hauteur au garrot 55 cm.

DUREE DE VIE : 20 ans

REGIME : Carnivore : oiseaux, lièvres, reptiles, chèvres...

REPARTITION : Inde, Chine, Malaisie, Birmanie, Sumatra...

HABITAT : Plaines, forêts tropicales, zones rocheuses...

PREDATEURS : l'homme

Ses petites oreilles rondes sont noires à l'arrière et marquées d'un point gris. Les yeux sont habituellement vert grisâtre ou jaune. Le chat de Temminck est doté d'un corps musclé et de longues jambes, qui, en plus de sa longue queue, font de lui un excellent grimpeur. Néanmoins, il a tendance à passer sa vie sur la terre ferme plutôt que dans les arbres. La mâchoire n'est dotée que de vingt huit dents contrairement aux autres félins qui en ont trente.

Le chat de Temminck est un habitant forestier, préférant les forêts de conifères tropicales et subtropicales, mais fréquente parfois les zones plus ouvertes comme les plaines rocailleuses.

Son régime alimentaire se compose principalement de petites proies comme les écureuils, les muntjacs et les petits serpents. Il mange aussi des rongeurs, des oiseaux, des reptiles, et des jeunes lièvres. Dans les montagnes goral du Sikkim, en Inde, on a même signalé que l'espèce chasse des animaux plus grands tels que les sangliers, les cerfs sambar et les jeunes buffle d'Asie. Dans les zones où l'homme est présent, il s'attaque aussi aux volailles domestiques, aux moutons et aux chèvres.

Après 78 à 80 jours de gestation, la femelle donne naissance à un petit dans un arbre creux, un trou entre des rochers ou tout autre endroit abrité. Les naissances ont lieu en février et se composent généralement d'un unique petit. Les principales menaces pesant sur le chat de Temminck sont la perte et la dégradation de l'habitat due à la déforestation, le braconnage causant le commerce illégal de peaux. En Asie du Sud, il est également menacé par la diminution du nombre de proies. Sa viande est également appréciée par les populations locales. Il est connu pour s'attaquer aux élevages, et c'est pour cette raison qu'il est activement chassé par les villageois..



Le chat de Temminck

1. Sur quel continent trouve-t-on le chat de Temminck ?

2. A quelle classe d'animaux appartient le chat de Temminck ?

les amphibiens

les mammifères

les reptiles

3. Décris le pelage du chat de Temming :

4. Dans quels types de milieux peut-on le rencontrer ?

5. Quelles sont les proies qu'il chasse ?

6. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le chat de Temming ?

7. Complète avec les données trouvées dans le document:

taille : _____

ordre : _____

famille : _____

régime : _____

durée de vie : _____

gestation : _____

nombre de petits : _____

Le chat de Temminck

1. Sur quel continent trouve-t-on le chat de Temminck ?

Asie

2. A quelle classe d'animaux appartient le chat de Temminck ?

les amphibiens

les mammifères

les reptiles

3. Décris le pelage du chat de Temming :

Son pelage est brun doré

4. Dans quels types de milieux peut-on le rencontrer ?

C'est un habitant forestier, préférant les forêts de conifères tropicales et subtropicales, mais qui fréquente parfois les zones plus ouvertes comme les plaines rocailleuses.

5. Quelles sont les proies qu'il chasse ?

les écureuils, les muntjacs et les petits serpents, des rongeurs, des oiseaux, des reptiles, et des jeunes lièvres. Parfois, les sangliers, les cerfs sambar et les jeunes buffle d'Asie. Il s'attaque aussi aux volailles domestiques, aux moutons et aux chèvres.

6. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le chat de Temming ?

la perte et la dégradation de l'habitat due à la déforestation, le braconnage, la diminution du nombre de proies...

7. Complète avec les données trouvées dans le document:

taille : longueur de 70 cm à 1 m, hauteur au garrot 55 cm.

ordre : carnivore

famille : félidé

régime : carnivore

durée de vie : 20 ans

gestation : 78 à 80 jours

nombre de petits : 1